Journal of Mammalogy, 82(4):1147–1155, 2001

INDEX TO VOLUME 82

AUTHORS

Abdala, F., 190
Aguilera, M., 520
Alexander, P. S., 700
Altendorf, K. B., 430
Alvarez-Castañeda, S. T., 775
Anderson, P. K., 623
Andrades-Miranda, J., 1080
Antolin, M. F., 946
Arbogast, B. S., 302
Armbrust, T. S., 407
Armstrong, M. I., 709
Aung, M., 836, 848
Baker, R. J., 81, 748, 960, 1092, 1102
Bartoov, B., 201
Bell, D. M., 81
Benado, M., 520
Benatar, G. R., 173
Benda, P., 799
Berger, J., 422
Bhatnagar, K. P., 209
Bickham, J. W., 102
Biggins, D. E., 906
Birney, E. C., 535
Bol, N., 43
Bonvicino, C. R., 109
Bouchard, S., 721
Bowman, J., 567
Bowyer, R. T., 814
Boyce, W. M., 231
Bradley, R. D., 81, 267, 791, 960
Brady, M. J., 974
Braun, J. K., 102
Britzke, E. R., 728
Brown, B. L., 289
Brown, J. S., 430
Browne, R. A., 302
Brunet, A. K., 1114
Bryant, J. P., 1
Burda, H., 1003
Burkanov, V. N., 1047
Burke, K. M., 173
Burnett, S. C., 339
Burrows, A. M., 209
Calkins, D. G., 500, 1047
Cameron, G. N., 652
Caro, T. M., 43
Carroll, C. R., 478
Cheng Yang, V. V., 700
Chow, S., 123
Clarke, J. A., 1054
Cluff, H. D., 867
Compton, L. A., 1054
Cooper, S. J. B., 328
Côté, S. D., 389
Cully, J. F., Jr., 889, 894
Davis, C. S., 491
Day, P. R., 328
Dayan, T., 1016
DeBry, R. W., 280
DeMaster, D. P., 641
Demastes, J. W., 65
Dilworth, T. G., 567
Ditchkoff, S. S., 239
Dobson, F. S., 573
Dolan, T. W., III, 22
Dziech, H. A., 179
Edwards, C. W., 81, 267, 791
Elangovan, V., 161
Ensz, K. L., 558
Euliss, B. R., 928
Fenton, M. B., 362, 721
Festa-Bianchet, M., 389
Filippucci, M. G., 799
Fleischer, R. C., 858
Florant, G. L., 551
Flores, D. A., 190
Forbes, G. J., 567
Fowler, C. W., 641
Freeman, P. W., 582
Frynta, D., 799
Fulhorst, C. F., 267
Gasaway, W. C., 814
Gaton, D. D., 1016
Geise, L., 92
Gelatt, T. S., 491
Genoways, H. H., 582
German, R. Z., 179
Getz, L. L., 22
Giannini, N. P., 190
Gockel, J., 1034
Goheen, J. R., 407
Gottreich, A., 201
Grubb, P., 374
Hafner, D. J., 775
Hafner, M. S., 65
Hamilton, M. J., 81
Hammel, I., 201
Hardcastle, B. T., 166
Harwood, J., 630
Herrera, J., 558
Herrera M., L. G., 352
Hobson, K. A., 352
Hoefs, M., 401
Hoffmann, F. G., 1092
Hoffmann, R. S., 1059
Hofmann, J. E., 22
Honeycutt, R. L., 173
Hoofer, S. R., 131, 320
Hoogland, J. L., 917
Horne, E. A., 407
Htung, S., 836
Ingrisano, D. R., 1054
Jiang, X.-l., 1059
Johnson, D. H., 928
Johnston, D. S., 362
Jones, M. E., 1016
Kawalika, M., 1003
Kazacos, K. R., 993
Kazial, K. A., 339
Kelly, M. J., 43, 440
Kent, C. J., 478
Kie, J. G., 814
Kosoy, M. Y., 906
Kovacs, K. M., 225
Kramer, K. M., 535
Krejčová, P., 545
Kremer, I., 1016
Kronfeld-Schor, N., 1016
Kudrna, D. G., 478
Kulbartz, B., 551
Kunz, T. H., 161
Lacher, T. E., Jr., 173
Lammers, A. R., 179
Lance, R. F., 166
Laundré, J. W., 430
Leberg, P. L., 166
Le Boeuf, B. J., 1047
Lee, C.-Y., 700
Lehmer, E. M., 551
Leslie, D. M., Jr., 239
Lewis-Oritt, N., 748
Lima-Rosa, C. A. V., 1080
Lochmiller, R. L., 239
Locker-Grütjen, O., 1003
Lomolino, M. V., 937
Longland, W. S., 681
López-González, C., 138, 760
López González, C. A., 430
Lydersen, C., 225
Lydersen, E., 225
Macholán, M., 799
Mamaev, E. G., 1047
Mandelik, Y., 1016
Mares, M. A., 102
Marimuthu, G., 161
Masters, W. M., 339
Matola, S., 43
Mattevi, M. S., 1080
McGuire, B., 22, 690
McNab, B. K., 709
McShea, W. J., 836, 848
Medellín, R. A., 1114
Méndez C., G., 352
Merrick, R. L., 1047
Merritt, J. F., 51
Messier, F., 463
Meyer, K. P., 825
Miller, S. D., 889
Mirón M., L., 352
Monfort, S., 836, 848
Mooney, M. P., 209
Morejohn, G. V., 877
Moscarella, R. A., 520
Muñiz Martínez, R., 81
Murray, K. L., 728
Nunes, A. P., 1080
Nyberg, D., 984
Oli, M. K., 573
Oliveira, L. F. B., 1080
Otazu, I. B., 109
Owen, J. G., 1102
Owen, R. D., 138

Page, L. K., 993
Pagels, J. F., 289
Paquet, P. C., 867
Patterson, B. R., 463
Patton, J. L., 92
Paxinos, E. E., 858
Pendleton, G. W., 1047
Pergams, O. R. W., 984
Perry, S. L., 641
Pilgrim, K. L., 858
Pitcher, K. W., 1047
Post, D. M., 407
Poszig, D., 848
Presley, S. J., 138, 760
Pyare, S., 681
Radillo, J., 35
Ralls, K., 858
Ramirez, P. B., 102
Ramírez P., N., 352
Ramsay, M. A., 867
Reardon, T. B., 328
Reese, C. L., 289
Ricca, M. A., 825
Richlen, M. F., 641
Riddle, B. R., 775
Roach, J. L., 946
Robbins, L. W., 728
Rodwell, T. C., 231
Rose, L. R., 51
Roslinski, D. L., 209
Ruf, T., 1034
Rylander, K., 218
Sádlová, J., 799
Sams, M. G., 239
Sánchez-Cordero, V., 352
Sandel, J. K., 173
Scharff, A., 1003
Scheel, D., 652
Schulz, M., 328
Schwartz, M. K., 858
Seidensticker, J., 1054
Seidman, V. M., 738
Seshadri, S., 280
Shirakihara, M., 123
Sidle, J. G., 928
Siegel, M. I., 209
Silva Júnior, J. S., 109
Siniff, D. B., 491
Slade, N. A., 974
Slauson, K. M., 478
Smallwood, P. D., 35
Smith, G. A., 937
Smith, M. F., 92
Smith, T. D., 209
Snell, L. C., 218
Soe, T. M., 836
Spradling, T. A., 65
Stapp, P., 946
Steele, M. A., 35
Stefen, C., 450
Stewart, K. M., 814
Strauss, R. E., 81
Strobeck, C., 491
Sullivan, S., 690
Swihart, R. K., 1, 993
Talley, A., 166
Terkel, J., 201
Testa, J. W., 422
Than, A., 836
Tkadlec, E., 545
Trites, A. W., 500
Turner, G., 35
Unangst, E. T., Jr., 527
Van Den Bussche, R. A., 131, 320, 748
Van Horne, B., 551, 946
Vernes, K., 1026
Vonhof, M. J., 721
Walker, C. W., 173
Walton, L. R., 867
Waters, J. M., 289
Weckerly, F. W., 414, 825
Weigl, P. D., 302
Weksler, M., 109
Wemmer, C., 836, 848
White, K. S., 422
White, P. J., 858
Whyte, I. J., 231
Wiggins, L. E., 81
Wilke, A. L., 558
Williams, E. S., 894
Willig, M. R., 138
Winship, A. J., 500
Wolff, J. O., 35
Wollberg, M., 1016
Wunder, B. A., 527
Yassur, Y., 1016
Yogev, L., 201
Yoshida, H., 123
Yoshioka, M., 123
Yu, J. Y. L., 700
Zabel, C. J., 738
Zanchin, N. I. T., 1080
Zegers, D. A., 51
Zielinski, W. J., 478
Zigouris, J., 721

SUBJECTS

(New names in *italic* type)

Acinonyx jubatus, 440
Acomys:
  cahirinus, 1016
  russatus, 1016
Acorn-embryo excision:
  Sciurus (2 spp.), 35
Activity:
  Acomys russatus, 1016
  Chiroptera, 738
  Phyllotis xanthopygus, 535
Aerial survey:
  Cynomys ludovicianus, 928
Aerodynamics:
  Glaucomys sabrinus, 1026
Age:
  Microtus arvalis, 545
  population effects, 573
Aggression:
  Cervus elaphus, 414, 825
Agouti paca, 43
Akodon:
  aff. cursor, 92
  cursor, 92
  lindberghi, 92
  montensis, 92
  mystax, 92
  serrensis, 92
Alaska:
  Alces alces, 422
  Eumetopias jubatus, 500, 1047
Alberta:
  Oreamnos americanus, 389
Alces alces, 1, 422, 814
Allometry:
  Didelphis albiventris, 190
Allozyme variation:
  Apodemus (4 spp.), 799
Alouatta pigra, 43
Ammospermophilus interpres, 652
Amphicyonidae (14 spp.), 450
Anabat, 721, 728
Androgen:
  Apodemus semotus, 700
  Spalax ehrenbergi, 201
Antarctica:
  Leptonychotes weddellii, 491
Antler size:
  Alces alces, 814
Antrozoini, 131
Antrozous pallidus, 362
Apodemus:
  arianus, 799
  falzfeini, 799
  flavicollis, 799, 1034
  fulvipectus, 799
  hermonensis, 799
  hyrcanicus, 799
  semotus, 700
  sylvaticus, 799
  uralensis, 799
  wardi, 799
Appalachian Mountains:
  Clethrionomys gapperi, 289

Argentina:
Graomys griseoflavus, 102
Phyllotis xanthopygus, 535
Arizona:
Neotoma (11 spp.), 267
Artibeus:
hirsutus, 960
inopinatus, 960
intermedius, 43, 960
jamaicensis, 352, 960
lituratus, 43, 960
obscurus, 960
phaeotis, 43
planirostris, 960
watsoni, 43
Asia Minor:
Apodemus (4 spp.), 799
Asymmetry:
Alces alces, 814
Oreamnos americanus, 389
Ateles geoffroyi, 43
Australia:
Myotis (3 spp.), 328
Baculum:
Leptonychotes weddellii, 877
Baiomys taylori, 652
Balantiopteryx io, 43
Behavior:
Alces alces, 422
Cervus elaphus, 825
Microtus ochrogaster, 974
Microtus pinetorum, 690
Nasua narica, 1054
Odocoileus hemionus, 430
Sigmodon hispidus, 974
Belize:
Agouti paca, 43
Alouatta pigra, 43
Artibeus (4 spp.), 43
Ateles geoffroyi, 43
Balantiopteryx io, 43
bat echolocation calls, 721
Cabassous centralis, 43
Carollia (2 spp.), 43
Chironectes minimus, 43
Coendou mexicanus, 43
Conepatus semistriatus, 43
Cryptotis parva, 43
Dasyprocta punctata, 43
Dasypus novemcinctus, 43
Desmodus rotundus, 43
Didelphis (2 spp.), 43
Eira barbara, 43
Glossophaga soricina, 43
Herpailurus yaguarondi, 43
Heteromys (2 spp.), 43
Lasiurus (2 spp.), 43
Leopardus (2 spp.), 43
Lonchorhina aurita, 43
Lutra longicaudus, 43
mammals of Maya Mountains (many spp.), 43
Marmosa (2 spp.), 43
Mazama americana, 43
Metachirus nudicaudatus, 43
Micoureus alstoni, 43
Mustela frenata, 43
Nasua narica, 43
Noctilio leporinus, 43
Nyctomys sumichrasti, 43
Odocoileus virginianus, 43
Orthogeomys (2 spp.), 43
Oryzomys (2 spp.), 43
Ototylomys phyllotis, 43
Panthera onca, 43
Philander opossum, 43
Potos flavus, 43
Puma concolor, 43
Rattus rattus, 43
Reithrodontomys gracilis, 43
Rhinophylla fischerae, 43
Rhynchonycteris naso, 43
Sciurus (3 spp.), 43,
Sigmodon hispidus, 43
Spilogale putorius, 43
Sturnira lilium, 43
Sylvilagus brasiliensis, 43
Tamandua mexicana, 43
Tapirus bairdii, 43
Tayassu (2 spp.), 43
Thyroptera tricolor, 43
Tylomys nudicaudus, 43
Urocyon cinereoargenteus, 43
Bering Sea:
Eumetopias jubatus, 500
Biogeography:
Clethrionomys gapperi, 289
Cynomys ludovicianus, 937
Peromyscus (15 spp.), 775
Tamiasciurus (3 spp.), 302
woody plants, 1
Birth timing:
Eumetopias jubatus, 1047
Body composition:
Microtus (2 spp.), 527
Body mass:
Eumetopias jubatus, 500
Pteropus (5 spp.), 709
Body size:
Eumetopias jubatus, 500
Bos bison, 407
Bovidae:
family-group names, 374
Pseudorygini (new tribe), 374
Bovine tuberculosis:
Syncerus caffer, 231
Brazil:
Akodon (6 spp.), 92
Oligoryzomys (7 spp.), 1080
Proechimys (2 spp.), 109
British Columbia:
Eumetopias jubatus, 1047
Burrow systems:
Cryptomys mechowi, 1003
Cabassous centralis, 43
Caching behavior:
Dipodomys spectabilis, 558
Sciurus (2 spp.), 35
California:
Antrozous pallidus, 362
Cervus elaphus, 414, 825
Chiroptera, 738
Eumetopias jubatus, 1047
Glaucomys sabrinus, 681
Peromyscus maniculatus, 681
Spermophilus lateralis, 681
Tamias (2 spp.), 681
Tamiasciurus douglasii, 681
Martes americana, 478
Vulpes macrotis, 858
Canary 1.2, 721
Canis:
latrans, 463
lupus, 422, 867
Carollia:
brevicauda, 43, 960
castanea, 960
perspicillata, 43, 960
subrufa, 960
Caves:
bat assemblages, 1114
Cavia porcellus, 65
Cervus:
elaphus, 414, 825
eldi, 836, 848
Chaetodipus:
hispidus, 652
intermedius, 652
nelsoni, 652
penicillatus, 65, 652
China:
Crocidura (6 spp.), 1059
Chinchilla lanigera, 179
Chiroderma:
doriae, 960
improvisum, 960
trinitatum, 960
villosum, 960
Chironectes minimus, 43
Chiroptera:
assemblages in caves, 1114
Chromosomal evolution:
Reithrodontomys (7 spp.), 81
Clethrionomys:
gapperi, 289
glareolus, 1034
rutilus, 1
Climate change:
marine mammals, 630
Rodentia, 652
Cline:
Uroderma bilobatum, 1102
Coendou mexicanus, 43
Coevolution:
Cynomys spp. and plague, 906
Coloniality:
Cynomys gunnisoni, 894
Cynomys leucurus, 894
Cynomys ludovicianus, 889, 894, 928, 937, 946
Colorado:
Cynomys ludovicianus, 551, 946
Microtus pennsylvanicus, 527
Community structure:
Microtus ochrogaster, 974

Sigmodon hispidus, 974
Competition:
Cervus elaphus, 414
marine mammals, 641
Computer technology:
individual identification, 440
Conepatus semistriatus, 43
Conservation:
Cervus eldi, 836
Cynomys gunnisoni, 894, 917
Cynomys leucurus, 894
Cynomys ludovicianus, 889, 894, 917, 928, 937, 946
Cynomys parvidens, 917
marine mammals, 623, 630, 641
Martes americana, 478
Microtus (2 spp.), 984
Peromyscus (2 spp.), 984
prairie habitat, 984
Spermophilus franklinii, 984
Contact zone:
Uroderma bilobatum, 1102
Corynorhinus:
rafinesquii, 166
townsendii, 738
Cowper's gland:
Spalax ehrenbergi, 201
Cranial nerves:
Sciurus (2 spp.), 218
Spermophilus (3 spp.), 218
Cratogeomys castanops, 65, 652
Crocidura:
attenuata, 1059
fuliginosa, 1059
gmelini, 1059
horsfieldii, 1059
rapax, 1059
russula, 1059
shantungensis, 1059
suaveolans, 1059
vorax, 1059
Cropping rate:
Cervus elaphus, 825
Cryptomys mechowi, 1003
Cryptotis parva, 43
Ctenomys boliviensis, 65
Cynomys:
gunnisoni, 889, 894, 917
leucurus, 889, 894
ludovicianus, 551, 652, 889, 894, 917, 928, 946
mexicanus, 889
parvidens, 889, 917
Cynopterus sphinx, 161
Cytochrome-*b* gene:
Akodon (6 spp.), 92
Artibeus (7 spp.), 960
Carollia (4 spp.), 960
Cavia porcellus, 65
Chaetodipus penicillatus, 65
Chiroderma (4 spp.), 960
Cratogeomys castanops, 65
Ctenomys boliviensis, 65
Dermanura (7 spp.), 960
Echimys chrysurus, 65
Euryzygomatomys spinosus, 65
Geomys bursarius, 65
Glossophaga (5 spp.), 960, 1092
Heterocephalus glaber, 65
Hystrix africaeaustralis, 65
Marmota flaviventris, 65
Mus musculus, 65
Myoprocta pratti, 65
Myotis (3 spp.), 328
Neotoma (11 spp.), 267
Neotoma (8 spp.), 960
Neotoma floridana, 791
Noctilio (2 spp.), 748
Oryctolagus cuniculus, 65
Pappogeomys bulleri, 65
Peromyscus (9 spp.), 960
Proechimys roberti, 109
Proechimys simonsi, 65
Rattus norvegicus, 65
Reithrodontomys (7 spp.), 81
Reithrodontomys (4 spp.), 960
Rhinophylla (3 spp.), 960
Sciurus carolinensis, 65
Sigmodon (9 spp.), 960
Spalax ehrenbergi, 65
Spermophilus tridecemlineatus, 65
Tamiasciurus (3 spp.), 302
Thomomys bulbivorus, 65
Thrichomys apereoides, 65
Uroderma (2 spp.), 960
Cytokines:
Odocoileus virginianus, 239
Czech Republic:
Microtus arvalis, 545
Dasyprocta punctata, 43
Dasypus novemcinctus, 43
Den sharing:
Vulpes macrotis, 858
Den site:
Canis lupus, 867
Dermanura:
aztecae, 960
concolor, 960
glauca, 960
gnoma, 960
phaeotis, 960
toltecae, 960
watsoni, 960
Desmodus rotundus, 43
Dicrostonyx groenlandicus, 1
Didelphis:
albiventris, 190
marsupialis, 43
virginianus, 43
Diet:
Antrozous pallidus, 362
Artibeus jamaicensis, 352
Bos bison, 407
Cervus eldi, 848
Cryptomys mechowi, 1003
Glossophaga soricina, 352
Dipodomys:
compactus, 652
elator, 652
merriami, 652
ordii, 652
spectabilis, 558, 652
Disease:
Cynomys gunnisoni, 894, 917
Cynomys leucurus, 894
Cynomys ludovicianus, 889, 894, 906, 917, 937, 946
Cynomys parvidens, 917
North American mammals (many spp.), 906
Syncerus caffer, 231
Dispersal:
Canis latrans, 463
Cynomys ludovicianus, 946
Distribution:
Crocidura (several spp.), 1059
Glossophaga (5 spp.), 1092
Martes americana, 478
Molossus (2 spp.), 760
Molossus currentium robustus, 760
Rodentia, 652
Diversity:
Chiroptera, 1114
Microtus ochrogaster, 974
Neotropical mammals (many spp.), 43
Sigmodon hispidus, 974
Echimys chrysurus, 65
Echolocation:
bat detector systems, 721
Eptesicus fuscus, 339, 728
Lasiurus borealis, 728
Lasiurus cinereus, 721
Myotis (5 spp.), 728
Nycticeius humeralis, 728
Pipistrellus subflavus, 728
Ecology:
Cervus eldi, 836
Cryptomys mechowi, 1003
Cynomys ludovicianus, 946
Martes americana, 478
plague, 906
Eira barbara, 43
El Salvador:
Uroderma bilobatum, 1102
Element analysis:
Erignathus barbatus, 225
Phoca hispida, 225
EM-SCAN®, Model SA-2:
Microtus pennsylvanicus, 527
Endangered species:
Cynomys ludovicianus, 889, 937, 946
Endangered Species Act, 889, 894, 928
Energetics:
Pteropus (5 spp.), 709
Environment:
marine mammals, 630
Epidemiology, plague:
Cynomys (3 spp.), 894
Epizootic, plague:
Cynomys (3 spp.), 894

Eptesicus fuscus, 339, 728, 738
Erethizon dorsatum, 652
Erignathus barbatus, 225
Eumetopias jubatus, 500, 1047
Euryzygomatomys spinosus, 65
Evolution:
  enamel structure in arctoid Carnivora, 450
  Noctilio (2 spp.), 748
  Ovis (7 spp.), 401
  rate heterogeneity in Rodentia (21 spp.), 65
  Reithrodontomys (7 spp.), 81
Extinction:
  marine mammals, 623, 641
Extinction, local:
  Spermophilus franklinii, 984
Fecundity:
  Microtus arvalis, 545
Feeding:
  Antrozous pallidus, 362
  Artibeus jamaicensis, 352
  Glossophaga soricina, 352
  Noctilio (2 spp.), 748
Fisheries:
  marine mammals, 641
Florida:
  Pteropus (5 spp.), 709
Flow cytometry:
  Graomys griseoflavus, 102
Folivery:
  Cynopterus sphinx, 161
Foraging:
  Acomys russatus, 1016
  Cervus elaphus, 825
  Cervus eldi, 848
  Chiroptera, 738
  Cynopterus sphinx, 161
  Erignathus barbatus, 225
  Odocoileus hemionus, 430
  Peromyscus leucopus, 993
  Phoca hispida, 225
Fostering behavior:
  Leptonychotes weddellii, 491
Frugivory:
  Cynopterus sphinx, 161
Fungi:
  Glaucomys sabrinus, 681
Fur discoloration:
  Erignathus barbatus, 225
  Phoca hispida, 225
Furipterus horrens, 320
Genetic divergence:
  Artibeus (7 spp.), 960
  Carollia (4 spp.), 960
  Chiroderma (4 spp.), 960
  Dermanura (7 spp.), 960
  Glossophaga (5 spp.), 960
  Neotoma (8 spp.), 960
  Peromyscus (9 spp.), 960
  Reithrodontomys (4 spp.), 960
  Rhinophylla (3 spp.), 960
  Sigmodon (9 spp.), 960
  Uroderma (2 spp.), 960
Genetics:
  Akodon (6 spp.), 92
  Clethrionomys gapperi, 289
  Cynomys ludovicianus, 946
  Graomys griseoflavus, 102
  Proechimys (2 spp.), 109
  Reithrodontomys (7 spp.), 81
  Rodents (22 spp.), 65
  Tamiasciurus (3 spp.), 302
Geographic variation:
  Graomys griseoflavus, 102
  Molossus (2 spp.), 760
  Molossus currentium robustus, 760
  Vespertilionidae, 728
Geomys:
  arenarius, 652
  attwateri, 652
  breviceps, 652
  bursarius, 65, 652
  knoxjonesi, 652
  personatus, 652
  texensis, 652
Germany:
  Apodemus flavicollis, 1034
  Clethrionomys glareolus, 1034
Glaucomys:
  sabrinus, 681, 1026
  volans, 51, 652
Gliding:
  Glaucomys sabrinus, 1026
Glossophaga:
  commissarisi, 960, 1092
  leachi, 960, 1092
  longirostris, 960, 1092
  morenoi, 960, 1092
  soricina, 43, 352, 960, 1092
Graomys griseoflavus, 102
Growth:
  Chinchilla lanigera, 179
  Eumetopias jubatus, 500
  Oryzomys albigularis, 520
Guyana:
  Proechimys (2 spp.), 109
Habitat:
  Acomys russatus, 1016
  Canis latrans, 463
  caves, bat assemblages, 1114
  Chiroptera, 738, 1114
  Corynorhinus rafinesquii, 166
  Cryptomys mechowi, 1003
  marine mammals, 630
  Martes americana, 478
  Microtus (2 spp.), 22, 984
  Peromyscus (2 spp.), 984
  Pipistrellus subflavus, 173
  prairie, 984
  Spermophilus franklinii, 984
Habitat use:
  Alces alces, 422
  Cervus eldi, 848
  Odocoileus hemionus, 430
Herbivory:
  winter, 1
Herpailurus yaguarondi, 43
Heterocephalus glaber, 65
Heteromys:
  desmarestianus, 43
  gaumeri, 43
Hibernacula:
  Pipistrellus subflavus, 173
Hibernation:
  Cynomys ludovicianus, 551
History of science, 582
Home range:
  Canis lupus, 867
  Cervus eldi, 836
Honduras:
  Uroderma bilobatum, 1102
Horns:
  Oreamnos americanus, 389
Human impacts:
  marine mammals, 623, 633, 641
Hydrodamalis gigas, 623, 630
Hystrix africaeaustralis, 65
Idaho:
  Odocoileus hemionus, 430
Identification:
  Acinonyx jubatus, 440
Illinois:
  habitat loss, 984
  Microtus (2 spp.), 22, 984
  Peromyscus (2 spp.), 984
  Spermophilus franklinii, 984
Immunocompetence:
  Odocoileus virginianus, 239
Inclusive fitness:
  Canis latrans, 463
India:
  Cynopterus sphinx, 161
Indiana:
  Microtus ochrogaster, 209
  Myotis (2 spp.), 728
  Peromyscus leucopus, 993
  Pipistrellus subflavus, 728
  Procyon lotor, 993
Indonesia:
  Myotis adversus, 328
Interleukin-6:
  Odocoileus virginianus, 239
Inventory:
  Belize (many spp.), 43
  Maya Mountains (many spp.), 43
Iran:
  Apodemus (4 spp.), 799
Island biogeography:
  Peromyscus (15 spp.), 775
Israel:
  Acomys (2 spp.), 1016
  Spalax ehrenbergi, 201
Japan:
  Neophocaena phocaenoides, 123
Juvenile survival:
  population effects, 573
Kansas:
  Bos bison, 407
  Eptesicus fuscus, 728
  Microtus ochrogaster, 974
  Myotis (2 spp.), 728
  Neotoma (2 spp.), 791

Pipstrellus subflavus, 728
Sigmodon hispidus, 974
Karyotype:
Akodon (6 spp.), 92
Oligoryzomys (7 spp.), 1080
Proechimys (2 spp.), 109
Uroderma bilobatum, 1102
Kentucky:
Eptesicus fuscus, 728
Lasiurus borealis, 728
Myotis (4 spp.), 728
Pipistrellus subflavus, 728
Kerivoula:
hardwicki, 320
papillosa, 320
Keystone species:
Cynomys ludovicianus, 889, 894, 928
Kinship:
Vulpes macrotis, 858
Lactation:
Syncerus caffer, 231
Land-use patterns:
Pipistrellus subflavus, 173
Lasionycteris noctivagans, 738
Lasiurus:
blossevillii, 43
borealis, 728
ega, 43
Leopardus:
pardalis, 43
wiedii, 43
Leptonychotes weddellii, 491, 877
Lepus:
americanus, 1, 463
californicus, 1
timidus, 1
Life history:
Oreamnos americanus, 389
Light intensity:
Phyllotis xanthopygus, 535
Liomys irroratus, 652
Litter size:
Cynomys (3 spp.), 917
Lonchorhina aurita, 43
Louisiana:
Corynorhinus rafinesquii, 166
Lutra longicaudus, 43
Mammal–human interactions:
Canis lupus, 867
marine mammals, 623, 630, 641
Mammal–plant interactions:
Sciurus (2 spp.), 35
winter herbivory, 1
Management:
Corynorhinus rafinesquii, 166
Mandibular oligodonty:
Ovis (7 spp.), 401
Marine mammals, 623, 630, 641
Marmosa:
mexicana, 43
robinsoni, 43
Marmota flaviventris, 65
Martes americana, 478
Maternal behavior:
Microtus pinetorum, 690
Mating systems:
Vulpes macrotis, 858
Mazama americana, 43
Metabolism:
Glaucomys volans, 51
Metachirus nudicaudatus, 43
Metapopulation:
Cynomys gunnisoni, 894
Cynomys leucurus, 894
Cynomys ludovicianus, 894, 946
Mexico:
Artibeus jamaicensis, 352
bat assemblages, 1114
Glossophaga soricina, 352
Neotoma (11 spp.), 267
Peromyscus (15 spp.), 775
Sciurus aureogaster, 35
Michigan:
Myotis (2 spp.), 728
Micoureus alstoni, 43
Microtus:
agrestis, 1
arvalis, 545
mexicanus, 652
ochrogaster, 22, 209, 527, 974, 984
pennsylvanicus, 1, 22, 209, 527, 984
pinetorum, 652, 690
Mississippi:
Neotoma (2 spp.), 791
Missouri:
Eptesicus fuscus, 728
Lasiurus borealis, 728
Myotis (4 spp.), 728
Neotoma (2 spp.), 791
Pipistrellus subflavus, 728
Mitochodrial DNA:
Akodon (6 spp.), 92
Antrozoini, 131
Furipteridae, 320
Myotis (3 spp.), 328
Myzopodidae, 320
Natalidae, 320
Neophocaena phocaenoides, 123
Neotoma albigula, 267
Nycticeini, 131
Peromyscus (15 spp.), 775
Plecotini, 131
Tamiasciurus (3 spp.), 302
Thyropteridae, 320
Molecular divergence:
Proechimys (2 spp.), 109
Molecular genetics:
Leptonychotes weddellii, 491
Molossus:
bondae, 760
currentium, 760
currentium robustus, 760
molossus, 320
obscurus, 760
rufus, 320
Monachus tropicalis, 630
Monogamy:
Microtus (2 spp.), 209
Oryzomys albigularis, 520
Mormoops megalophylla, 748
Morphology:
Chinchilla lanigera, 179
Didelphis albiventris, 190
Leptonychotes weddelli, 877
Molossus (2 spp.), 760
Molossus currentium robustus, 760
Proechimys (2 spp.), 109
Sciurus (2 spp.), 218
Spermophilus (3 spp.), 218
Morphometrics:
Molossus currentium, 760
Molossus currentium robustus, 760
Myotis (6 spp.), 138
Proechimys (2 spp.), 109
Sciurus (2 spp.), 218
Spalax ehrenbergi, 201
Spermophilus (3 spp.), 218
Mortality:
marine mammals, 623, 630, 641
Odocoileus virginianus, 239
Motivation-structural rules:
Nasua narica, 1054
Movement patterns:
Canis lupus, 867
Mus:
caroli, 280
macedonicus, 280
musculus, 65, 280
pahari, 280
spicilegus, 280
spretus, 280
Mustela frenata, 43
Mustelidae (39 spp.), 450
Myanmar:
Cervus eldi, 836, 848
Mycobacterium bovis:
Syncerus caffer, 231
Mycophagy:
Glaucomys sabrinus, 681
Peromyscus maniculatus, 681
Spermophilus lateralis, 681
Tamias (2 spp.), 681
Tamiasciurus douglasii, 681
Myoprocta pratti, 65
Myotis:
adversus, 328
albescens, 138
californicus, 738
evotis, 738
grisescens, 728
leibii, 728
levis, 138
lucifugus, 728
macropus, 328
moluccarun, 328
nigricans, 138
riparius, 138, 320
ruber, 138
septentrionalis, 728
simus, 138

sodalis, 728
thysanodes, 738
velifer, 320
volans, 738
Myzopoda aurita, 320
Nasua narica, 43, 1054
Natalus:
micropus, 320
stramineus, 320
Natural history:
Cryptomys mechowi, 1003
Nebraska:
Cynomys ludovicianus, 928
Nematodes:
Baylisascaris procyonis, 993
Neophocaena phocaenoides, 123
Neotoma:
albigula, 267, 652, 960
alleni, 267, 960
cinerea, 267, 960
floridana, 267, 652, 791, 960
goldmani, 267, 960
leucodon, 267, 960
magister, 791, 960
mexicana, 267, 652, 960
micropus, 267, 652, 960
nelsoni, 267
palatina, 267
varia, 267
Neotropics:
diversity (many spp.), 43
Noctilio (2 spp.), 748
New Brunswick:
Glaucomys sabrinus, 1026
Peromyscus maniculatus, 567
New Mexico:
Dipodomys spectabilis, 558
Neotoma (11 spp.), 267
New York:
Microtus pinetorum, 690
Nicaragua:
Molossus currentium robustus, 760
Uroderma bilobatum, 1102
Noctilio:
albiventris, 320, 748
leporinus, 43, 320, 748
Nomenclature:
Bovidae, 374
Molossus (3 spp.), 760
Molossus currentium robustus, 760
North America:
Tamiasciurus (3 spp.), 302
North Carolina:
Eptesicus fuscus, 728
Lasiurus borealis, 728
Myotis (3 spp.), 728
Pipistrellus subflavus, 728
North Dakota:
Cynomys ludovicianus, 928
Northwest Territories:
Canis lupus, 867
Norway:
Erignathus barbatus, 225
Phoca hispida, 225
Nova Scotia:
Canis latrans, 463
Nuclear DNA:
Mus (8 spp.), 280
Rattus norvegicus, 280
Nunavut:
Canis lupus, 867
Nycticeini, 131
Nycticeius humeralis, 728
Nyctomys sumichrasti, 43
Ochrotomys nuttalli, 652
Odocoileus:
hemionus, 1, 430
virginianus, 1, 43, 239, 463
Ohio:
Eptesicus fuscus, 339
Oklahoma:
Cynomys ludovicianus, 937
Neotoma (11 spp.), 267
Neotoma (2 spp.), 791
Odocoileus virginianus, 239
Oligoryzomys:
eliurus, 1080
flavescens, 1080
messorius, 1080
microtus, 1080
nigripes, 1080
stramineus, 1080
Ontogeny:
Chinchilla lanigera, 179
Didelphis albiventris, 190
Leptonychotes weddelli, 877
Oryzomys albigularis, 520
Onychomys:
arenicola, 652
leucogaster, 652
Oreamnos americanus, 389
Oregon:
Eumetopias jubatus, 1047
Martes americana, 478
Orthogeomys:
heterodus, 43
hispidus, 43
Oryctolagus cuniculus, 65
Oryzomys:
albigularis, 520
alfaroi, 43
couesi, 43, 652
palustris, 652
Otonycteris, 131
Ototylomys phyllotis, 43
Ovis:
ammon, 401
aries, 401
canadensis, 401
dalli, 401
gmelini, 401
nivicola, 401
vignei, 401
Panthera onca, 43
Pappogeomys bulleri, 65
Papua New Guinea:
Myotis (2 spp.), 328
Paraguay:
Akodon montensis, 92
Myotis (6 spp.), 138
Parasitism:
Baylisascaris procyonis, 993
Cryptomys mechowi, 1003
Peromyscus leucopus, 993
Procyon lotor, 993
Paternal behavior:
Microtus (2 spp.), 209
Pennsylvania:
acorn use by small mammals, 35
Glaucomys volans, 51
Microtus pennsylvanicus, 209
Perognathus:
flavescens, 652
flavus, 652
Peromyscus:
attwateri, 652
beatae, 960
boylii, 652, 775, 960
californicus, 775
caniceps, 775
crinitus, 775
dickeyi, 775
difficilis, 960
eremicus, 652, 775
eva, 775
fraterculus, 775
gossypinus, 652
gratus, 960
interparietalis, 775
leucopus, 652, 775, 984, 993
levipes, 960
maniculatus, 567, 652, 681, 775, 984
merriami, 775
nasutus, 652, 960
pectoralis, 652
sejugis, 775
simulus, 960
slevini, 775
stephani, 775
truei, 652, 960
Philander opossum, 43
Phoca hispida, 225
Phocidae, 877
Photoperiod:
Apodemus flavicollis, 1034
Clethrionomys glareolus, 1034
Microtus arvalis, 545
Phyllotis xanthopygus, 535
Phylogeny:
Akodon (6 spp.), 92
Antrozoini, 131
Furipteridae, 320
Glossophaga (5 spp.), 1092
Mus (8 spp.), 280
Myotis (3 spp.), 328
Myzopodidae, 320
Natalidae, 320
Neotoma (11 spp.), 267
Neotoma floridana, 791
Noctilio (2 spp.), 748
Nycticeini, 131

Plecotini, 131
Rattus norvegicus, 280
Reithrodontomys (7 spp.), 81
Sigmodon (9 spp.), 960
Tamiasciurus (3 spp.), 302
Thyropteridae, 320
Phylogeography:
Glossophaga (5 spp.), 1092
Pipistrellus subflavus, 173, 728
Tamiasciurus (3 spp.), 302
Piscivory:
Noctilio leporinus, 748
Plague:
Asia, 906
Cynomys gunnisoni, 894, 917
Cynomys leucurus, 894
Cynomys ludovicianus, 889, 894, 906, 917, 937, 946
Cynomys parvidens, 917
ecology, 906
North American mammals (many spp.), 906
resistance, 906
Plants, woody:
winter herbivory, 1
Plecotini, 131
Pleistocene megafauna:
marine mammals, 623
Population cycles:
α-hypothesis, 573
Microtus (2 spp.), 22
Peromyscus maniculatus, 567
small mammals, 573
Population dynamics:
Microtus ochrogaster, 974
Peromyscus maniculatus, 567
Pipistrellus subflavus, 173
Sigmodon hispidus, 974
Syncerus cafer, 231
Population genetics:
Cynomys ludovicianus, 946
Neophocaena phocaenoides, 123
Potos flavus, 43
Prairie:
habitat loss, 984
Microtus (2 spp.), 984
Peromyscus (2 spp.), 984
Spermophilus franklinii, 984
Precipitation effects:
Cynomys ludovicianus, 551
Predation:
Alces alces, 422
Cervus eldi, 836
marine mammals, 641
Odocoileus hemionus, 430
Phyllotis xanthopygus, 535
Predator–prey interactions:
Canis latrans, 463
Lepus americanus, 463
Odocoileus virginianus, 463
Procyon lotor, 993
Procyonidae (10 spp.), 450
Proechimys:
oris, 109
roberti, 109
simonsi, 65
Prostate:
Spalax ehrenbergi, 201
Protein:
Artibeus jamaicensis, 352
Glossophaga soricina, 352
Pseudorygini (new tribe), 374
Pteronotus parnellii, 748
Pteropus:
giganteus, 709
hypomelanus, 709
pumilus, 709
rodricensis, 709
vampyrus, 709
Puma concolor, 43, 430
Racal, 721
Rattus:
norvegicus, 65
rattus, 43
Recombination activating gene-2:
Noctilio (2 spp.), 748
Reduced nicotinamide adenine dinucleotide dehydrogenase 2:
Myotis (3 spp.), 328
Reithrodontomys:
fulvescens, 81, 652
gracilis, 43
humulis, 81, 652
megalotis, 81, 652, 960
montanus, 81, 652, 960
raviventris, 81, 960
sumichrasti, 81
zacatecae, 81, 960
Reproduction:
Apodemus flavicollis, 1034
Apodemus semotus, 700
Canis latrans, 463
Cervus eldi, 836
Clethrionomys glareolus, 1034
Cynomys (3 spp.), 917
Eumetopias jubatus, 1047
Microtus arvalis, 545
Oreamnos americanus, 389
Spalax ehrenbergi, 201
Syncerus caffer, 231
Reproductive costs:
Microtus arvalis, 545
Reproductive strategies:
Apodemus flavicollis, 1034
Cervus elaphus, 825
Clethrionomys glareolus, 1034
Microtus ochrogaster, 209
Microtus pennsylvanicus, 209
Resource limitation:
marine mammals, 623, 630, 641
Retinal structure:
Acomys (2 spp.), 1016
Rhinophylla:
alethina, 960
fischerae, 43, 960
pumilio, 960
Rhinopoma hardwickei, 320
Rhynchonycteris naso, 43
Rodentia, 652
Roosting:
Corynorhinus rafinesquii, 166
Pipistrellus subflavus, 173
Russia:
Eumetopias jubatus, 1047
Scientific meetings:
American Society of Mammalogists, 582
Sciurus:
aureogaster, 35
carolinensis, 35, 65, 218, 652
deppei, 43
niger, 218, 652
variegatoides, 43
yucatanensis, 43
Sea of Cortéz islands:
Peromyscus (15 spp.), 775
Sex glands:
Spalax ehrenbergi, 201
Sexual characteristics:
Alces alces, 814
Sexual dimorphism:
Chinchilla lanigera, 179
Eumetopias jubatus, 500
Myotis (6 spp.), 138
Oryzomys albigularis, 520
Pteropus (5 spp.), 709
Sexual segregation:
Bos bison, 407
Cervus elaphus, 825
Cervus eldi, 848
Sierra Nevada:
Glaucomys sabrinus, 681
Peromyscus maniculatus, 681
Spermophilus lateralis, 681
Tamias (2 spp.), 681
Tamiasciurus douglasii, 681
Sigmodon:
alleni, 960
arizonae, 960
fulviventer, 960
hirsutus, 960
hispidus, 43, 652, 960, 974
leucotis, 960
mascotensis, 960
ochrognathus, 652, 960
toltecus, 960
Skull development:
Didelphis albiventris, 190
Social behavior:
Cervus elaphus, 414, 825
Glaucomys volans, 51
Vulpes macrotis, 858
Social organization:
Canis latrans, 463
Cervus eldi, 836
South Africa:
Syncerus caffer, 231
South Carolina:
Neotoma (2 spp.), 791
South Dakota:
Cynomys ludovicianus, 928
Space use:
Canis latrans, 463
Canis lupus, 867
Spalax ehrenbergi, 65, 201

Species–area relationship:
bat assemblages in caves, 1114
Species boundaries:
Myotis (3 spp.), 328
Species concepts:
Artibeus (7 spp.), 960
Carollia (4 spp.), 960
Chiroderma (4 spp.), 960
Dermanura (7 spp.), 960
Glossophaga (5 spp.), 960
Neotoma (8 spp.), 960
Peromyscus (9 spp.), 960
Reithrodontomys (4 spp.), 960
Rhinophylla (3 spp.), 960
Sigmodon (9 spp.), 960
Uroderma (2 spp.), 960
Sperm:
Spalax ehrenbergi, 201
Spermatogenesis:
Apodemus semotus, 700
Spermophilus:
franklinii, 984
lateralis, 681
mexicanus, 218, 652
spilosoma, 652
tridecemlineatus, 65, 218, 652
variegatus, 218, 652
Spilogale putorius, 43
Streams:
Chiroptera, 738
Sturnira lilium, 43
Suckling behavior:
Microtus pinetorum, 690
Survival:
Glaucomys volans, 51
Odocoileus virginianus, 239
Sylvilagus brasiliensis, 43
Syncerus caffer, 231
Systematics:
Apodemus (4 spp.), 799
Artibeus (7 spp.), 960
Carollia (4 spp.), 960
Chiroderma (4 spp.), 960
Crocidura (several spp.), 1059
Dermanura (7 spp.), 960
Furipteridae, 320
Glossophaga (5 spp.), 960, 1092
Myzopodidae, 320
Natalidae, 320
Neotoma (2 spp.), 791
Neotoma (8 spp.), 960
Peromyscus (9 spp.), 960
Reithrodontomys (4 spp.), 960
Rhinophylla (3 spp.), 960
Sigmodon (9 spp.), 960
Thyropteridae, 320
Uroderma (2 spp.), 960
Taiwan:
Apodemus semotus, 700
Tamandua mexicana, 43
Tamias:
canipes, 652
quadrimaculatus, 681
speciosus, 681
Tamiasciurus:
douglasii, 302, 681
hudsonicus, 302
mearnsi, 302
Tanzania:
Acinonyx jubatus, 440
Tapirus bairdii, 43
Taxonomy:
Crocidura (several spp.), 1059
Glossophaga (5 spp.), 1092
Molossus (3 spp.), 760
Molossus currentium robustus, 760
Myotis (6 spp.), 138
Otonycteris, 131
Proechimys (2 spp.), 109
Tayassu:
pecari, 43
tajacu, 43
Temperature effects:
Cynomys ludovicianus, 551
Temporal patterns:
Acomys russatus, 1016
Cynopterus sphinx, 161
Temporal scales:
Microtus ochrogaster, 974
Sigmodon hispidus, 974
Tennessee:
Eptesicus fuscus, 728
Lasiurus borealis, 728
Myotis (4 spp.), 728
Pipistrellus subflavus, 728
Texas:
Neotoma (11 spp.), 267
Neotoma (2 spp.), 791
Pipistrellus subflavus, 173
Rodentia, 652
Sciurus (2 spp.), 218
Spermophilus (3 spp.), 218
Thermogenesis:
Glaucomys volans, 51
Thermoregulation:
Glaucomys volans, 51
Pteropus (5 spp.), 709
Thomomys:
bottae, 652
bulbivorus, 65
Thrichomys apereoides, 65
Thyroptera:
discifera, 320
tricolor, 43, 320
Tooth enamel:
Amphicyonidae (14 spp.), 450
Mustelidae (39 spp.), 450
Procyonidae (10 spp.), 450
Ursidae (19 spp.), 450
Torpor:
Cynomys ludovicianus, 551
Tuberculosis:
Syncerus caffer, 231
Tumor necrosis factor-α:
Odocoileus virginianus, 239
Twinning:
Leptonychotes weddellii, 491
Tylomys nudicaudus, 43
Urocyon cinereoargenteus, 43
Uroderma:
bilobatum, 960, 1102
magnirostrum, 960
Ursidae (19 spp.), 450
Ursus arctos, 422
Utah:
Odocoileus hemionus, 430
Variation in echolocation calls:
Eptesicus fuscus, 339
Venezuela:
Oryzomys albigularis, 520
Proechimys (2 spp.), 109
Vigilance:
Alces alces, 422
Odocoileus hemionus, 430
Virginia:
Clethrionomys gapperi, 289
Neotoma (2 spp.), 791
Vocalizations:
Nasua narica, 1054
Vomeronasal neuroepithelium:
Microtus (2 spp.), 209
Vulpes macrotis, 858
Washington:
Martes americana, 478
West Virginia:
Neotoma (2 spp.), 791
Winter breeding:
Apodemus flavicollis, 1034
Clethrionomys glareolus, 1034
Women in science, 582
Wyoming:
Cynomys ludovicianus, 928
Yersinia pestis:
Asia, 906
Cynomys gunnisoni, 894, 917
Cynomys leucurus, 894
Cynomys ludovicianus, 889, 894, 906, 917, 937, 946
Cynomys parvidens, 917
ecology, 906
North American mammals (many spp.), 906
resistance, 906
Zambia:
Cryptomys mechowi, 1003